

褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換
(寝返り)

病的骨突出

浮腫
(局所以外の部位)

関節拘縮

皮膚湿潤
(多汗/尿・便失禁)

栄養状態低下

床ずれの有無

床ずれなし 予防	NPUAP分類(2007年)				ポケット褥瘡	術後	OH スコア レベル
	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ			

◎	◎	○					中等度
◎	◎	○					中等度
◎	◎	◎	○				中等度
◎	◎	◎	○			◎	中等度
◎	◎	○					中等度
◎	◎	○					中等度
○	◎	◎	◎			○ 圧切替 非設定	高度
○	◎	◎	○	○			高度
○	○	◎	◎	○		○ 静止設定	高度
○	○	○	◎	◎	◎	○ 三段階 圧切替	高度
○	○	○	◎	◎	◎	○ 微波動モード	高度
○	○	◎	◎	○			高度
○	◎	◎	○	○	○		高度
○	◎	◎	◎			○ 圧切替 非設定	高度

OHスケール


評価項目	判定		
1 自立体位変換	できる	もたない	できない
	0点	1.5点	3点
2 病的骨突出(仙骨)	なし	中等度・	高度
	0点	1.5点	3点
3 浮腫(むくみ)	なし	あり	
	0点	3点	
4 関節拘縮	なし	あり	
	0点	1点	
合計	点		

OHスコアレベル


0点	危険要因なし
1~3点	軽度 レベル
4~6点	中等度 レベル
7~10点	高度 レベル

2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0~2cm未満なら「軽度・中等度」



- 2cm以上なら「高度」



3. 浮腫(むくみ)の判定基準

