

褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換
(寝返り)

病的骨突出

浮腫
(局所以外の部位)

関節拘縮

皮膚湿潤
(多汗/尿・便失禁)

栄養状態低下

床ずれの有無

NPUAP分類(2007年)

ステージⅠ


ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

ポケット
褥瘡

術後

OH
スコア
レベル床ずれなし
予防

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

OHスケール


評価項目		判定		
1	自立体位変換	できる 0点	どちらでもない 1.5点	できない 3点
2	病的骨突出 (仙骨)	なし 0点	軽度・中等度 1.5点	高度 3点
3	浮腫 (むくみ)	なし 0点	あり 3点	
4	関節拘縮	なし 0点	あり 1点	
合計		点		

OHスコアレベル


0点	危険要因なし
1～3点	軽度 レベル
4～6点	中等度 レベル
7～10点	高度 レベル

2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」



- 2cm以上なら「高度」



3. 浮腫(むくみ)の判定基準

