

褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

- 自立体位変換 (寝返り)
- 病的骨突出
- 浮腫 (局所以外の部位)
- 関節拘縮
- 皮膚湿潤 (多汗/尿・便失禁)
- 栄養状態低下

床ずれの有無							OH スコア レベル
床ずれなし 予防	NPUAP分類(2007年)				ポケット 褥瘡	術後	
	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ			
○	○	○	○	○			中等度
○	○	○	○	○			中等度
○	○	○	○	○			中等度
○	○	○	○	○			中等度
○	○	○	○	○		○	中等度
○	○	○	○	○			高度
○	○	○	○	○	○		高度
○	○	○	○	○		○ 静止設定	高度
○	○	○	○	○	○	○ 三段階 圧切替	高度
○	○	○	○	○	○	○ 微波動モード	高度
○	○	○	○	○			中等度
○	○	○	○	○			高度
○	○	○	○	○		○ 圧切替 非設定	高度


OHスケール

評価項目	判定		
1 自立体位変換	できる	できない もたじろいで	できない
	0点	1.5点	3点
2 病的骨突出 (仙骨)	なし	軽度・中等度	高度
	0点	1.5点	3点
3 浮腫 (むくみ)	なし	あり	
	0点	3点	
4 関節拘縮	なし	あり	
	0点	1点	
合計	点		


OHスコアレベル	
0点	危険要因なし
1~3点	軽度 レベル
4~6点	中等度 レベル
7~10点	高度 レベル

2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0~2cm未満なら「軽度・中等度」



- 2cm以上なら「高度」



3. 浮腫 (むくみ) の判定基準



※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。